

High school geometry theorems

Hilbert's axiomatic system.

Formalizovano od strane: Sana Stojanovic Djurdjevic

Dokaz generisan uz pomoć: ArgoGeoChecker.

30.03.2018.

Teorema 1 (th_22_01.) *Pod pretpostavkom da važi $p \neq q$ i prave p i q se seku i $p \in \alpha$ i $p \in \beta$ i $q \in \alpha$ i $q \in \beta$ pokazati da postoji tačka A tako da važi $A \in p$ i $A \in q$.*

Dokaz:

1. Na osnovu činjenice prave p i q se seku postoji tačka A tako da važi $p \neq q$ i $A \in p$ i $A \in q$ (aksioma D6).
2. Zaključak teoreme sledi iz činjenica $A \in p$ i $A \in q$.

QED

Teorema 2 (th_22_02.) *Pod pretpostavkom da važi $p \neq q$ i prave p i q se seku i $p \in \alpha$ i $p \in \beta$ i $q \in \alpha$ i $q \in \beta$ i $A \in p$ i $A \in q$ pokazati da postoji tačka B tako da važi $A \neq B$ i $B \in p$.*

Dokaz:

1. Postoje tačka B i tačka C tako da važi $B \neq C$ i $B \in p$ i $C \in p$ (aksioma I3a).
2. Važi $A = B$ ili $A \neq B$.
3. Pretpostavimo da važi: $A = B$.
4. Na osnovu činjenica $B \neq C$ i $A = B$ važi $A \neq C$.
5. Zaključak teoreme sledi iz činjenica $A \neq C$ i $C \in p$.
6. Pretpostavimo da važi: $A \neq B$.
7. Zaključak teoreme sledi iz činjenica $A \neq B$ i $B \in p$.
8. Teorema je dokazana u svim slučajevima.

QED

Teorema 3 (th_22_03.) *Pod pretpostavkom da važi $p \neq q$ i prave p i q se seku i $p \in \alpha$ i $p \in \beta$ i $q \in \alpha$ i $q \in \beta$ i $A \in p$ i $A \in q$ i $A \neq B$ i $B \in p$ pokazati da postoji tačka C tako da važi $A \neq C$ i $C \in q$.*

Dokaz:

1. Postoje tačka C i tačka D tako da važi $C \neq D$ i $C \in q$ i $D \in q$ (aksioma I3a).
2. Važi $A = C$ ili $A \neq C$.
3. Pretpostavimo da važi: $A = C$.
4. Na osnovu činjenica $C \neq D$ i $A = C$ važi $A \neq D$.
5. Zaključak teoreme sledi iz činjenica $A \neq D$ i $D \in q$.

6. Pretpostavimo da važi: $A \neq C$.
7. Zaključak teoreme sledi iz činjenica $A \neq C$ i $C \in q$.
8. Teorema je dokazana u svim slučajevima.

QED

Teorema 4 (th_22.04.) *Pod pretpostavkom da važi $p \neq q$ i prave p i q se seku i $p \in \alpha$ i $p \in \beta$ i $q \in \alpha$ i $q \in \beta$ i $A \in p$ i $A \in q$ i $A \neq B$ i $B \in p$ i $A \neq C$ i $C \in q$ pokazati da važi $\neg col(A, B, C)$.*

Dokaz:

1. Važi $C \in p$ ili $C \notin p$.
2. Pretpostavimo da važi: $C \in p$.
3. Na osnovu činjenica $A \neq C$ i $A \in p$ i $C \in p$ i $A \in q$ i $C \in q$ važi $p = q$ (aksioma I2).
4. Na osnovu činjenica $p \neq q$ i $p = q$ dobijamo kontradikciju.
5. Pretpostavimo da važi: $C \notin p$.
6. Na osnovu činjenica $A \neq B$ i $A \in p$ i $B \in p$ i $C \notin p$ važi $\neg col(A, B, C)$ (aksioma D1a).
7. Zaključak teoreme sledi iz činjenice $\neg col(A, B, C)$.
8. Teorema je dokazana u svim slučajevima.

QED

Teorema 5 (th_22.05.) *Pod pretpostavkom da važi $p \neq q$ i prave p i q se seku i $p \in \alpha$ i $p \in \beta$ i $q \in \alpha$ i $q \in \beta$ i $A \in p$ i $A \in q$ i $A \neq B$ i $B \in p$ i $A \neq C$ i $C \in q$ i $\neg col(A, B, C)$ pokazati da važi $A \in \alpha$ i $B \in \alpha$ i $C \in \alpha$.*

Dokaz:

1. Na osnovu činjenica $p \in \alpha$ i $A \in p$ važi $A \in \alpha$ (aksioma D11).
2. Na osnovu činjenica $p \in \alpha$ i $B \in p$ važi $B \in \alpha$ (aksioma D11).
3. Na osnovu činjenica $q \in \alpha$ i $C \in q$ važi $C \in \alpha$ (aksioma D11).
4. Zaključak teoreme sledi iz činjenica $A \in \alpha$ i $B \in \alpha$ i $C \in \alpha$.

QED

Teorema 6 (th_22.06.) *Pod pretpostavkom da važi $p \neq q$ i prave p i q se seku i $p \in \alpha$ i $p \in \beta$ i $q \in \alpha$ i $q \in \beta$ i $A \in p$ i $A \in q$ i $A \neq B$ i $B \in p$ i $A \neq C$ i $C \in q$ i $\neg col(A, B, C)$ i $A \in \alpha$ i $B \in \alpha$ i $C \in \alpha$ pokazati da važi $A \in \beta$ i $B \in \beta$ i $C \in \beta$.*

Dokaz:

1. Na osnovu činjenica $p \in \beta$ i $A \in p$ važi $A \in \beta$ (aksioma D11).
2. Na osnovu činjenica $p \in \beta$ i $B \in p$ važi $B \in \beta$ (aksioma D11).
3. Na osnovu činjenica $q \in \beta$ i $C \in q$ važi $C \in \beta$ (aksioma D11).
4. Zaključak teoreme sledi iz činjenica $A \in \beta$ i $B \in \beta$ i $C \in \beta$.

QED

Teorema 7 (th_22.07.) *Pod pretpostavkom da važi $p \neq q$ i prave p i q se seku i $p \in \alpha$ i $p \in \beta$ i $q \in \alpha$ i $q \in \beta$ i $A \in p$ i $A \in q$ i $A \neq B$ i $B \in p$ i $A \neq C$ i $C \in q$ i $\neg col(A, B, C)$ i $A \in \alpha$ i $B \in \alpha$ i $C \in \alpha$ i $A \in \beta$ i $B \in \beta$ i $C \in \beta$ pokazati da važi $\alpha = \beta$.*

Dokaz:

1. Na osnovu činjenica $\neg col(A, B, C)$ i $A \in \alpha$ i $B \in \alpha$ i $C \in \alpha$ i $A \in \beta$ i $B \in \beta$ i $C \in \beta$ važi $\alpha = \beta$ (aksioma I5).
2. Zaključak teoreme sledi iz činjenice $\alpha = \beta$.

QED